

## Injection de médicaments dans une poche de dialysat

Le plus souvent, c'est un antibiotique (Vancomycine, Garamycine, ...) dans le cas de péritonite. On met les antibiotiques dans la dernière poche de la journée pour avoir un contact d'au moins 6 heures. C'est pour cette raison que les patients traités par Cycloer repasse en méthode manuelle pendant environ 3 à 4 semaines. La durée du traitement dépend de la clinique du patient et du taux de vancocinémie.

On utilise la même technique pour l'injection d'Héparine ou de Liquémine (100UI/ml) en cas de fibrine dans le liquide de drainage qui pourrait boucher le cathéter.

On met de la Liquémine (OM) : 1000 unités soit 2 amp de 5 ml par poche de 2 litres. A reconduire selon OM.

### **Matériel :**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dialysat contrôlé           | <input type="checkbox"/> Seringues         |
| <input type="checkbox"/> Masque                      | <input type="checkbox"/> 2 aiguilles roses |
| <input type="checkbox"/> Désinfectant pour les mains | <input type="checkbox"/> Tampons stériles  |
| <input type="checkbox"/> Médicament                  |  |
| <input type="checkbox"/> Solution de Bétadine verte  |  |

**Marche à suivre:** *L'idéal est de mettre les ATB après avoir fait le flush. Si ce n'est pas possible ( ex : Quand le patient fait lui-même), suivre le protocole ci-dessous :*

- ✓ **Mettre le masque et se désinfecter les mains**
- ✓ **Ouvrir l'emballage de la poche de dialysat**
- ✓ **Ouvrir l'emballage de tampons stériles et les imbiber de solution Bétadine**
- ✓ **Se désinfecter les mains, mettre des gants pour ne pas se mettre de la Bétadine sur les doigts**
- ✓ **Mettre un tampon bétadiné sur le site d'injection de la poche de dialysat et sur celui du flacon du médicament à injecter.**
- ✓ **Prélever le médicament**
- ✓ **Changer l'aiguille**
- ✓ **Injecter le médicament avec précaution dans la poche de dialysat**
- ✓ **Retirer l'aiguille**
- ✓ **Bien mélanger le médicament en retournant plusieurs fois la poche**
- ✓ **Lorsque plusieurs médicaments doivent être injectés, laisser l'aiguille dans le site d'injection et ne changer que la seringue.**
- ✓ **Enlever les gants et se désinfecter les mains.**