

ABLATION D'UN CATHETER DE DIALYSE PROVISOIRE

Le cathéter de dialyse provisoire peut-être implanté : en jugulaire, en sous-clavier, ou en fémoral.

L'ablation du cathéter se fait avec un ordre médical.

Le cathéter provisoire peut-être enlevé pour différentes raisons :

1. Si le patient a bénéficié d'une voie d'abord permanente pour la dialyse, par exemple, une fistule qui est fonctionnelle.
2. Si apparition de signes d'infection du cathéter provisoire.
3. Si le patient, dialysé en aigu, a repris une fonction rénale suffisante pour se passer d'hémodialyse.

**RISQUES LORS DU RETRAIT : EMBOLIE GAZEUSE
RUPTURE DU CATHETER
SAIGNEMENT, HEMATOME**

MATERIEL

- un set à pansement
- un coupe fil (scalpel)
- gants non stériles
- désinfectant alcoolique
- désinfectant pour les mains
- tube pour la culture du cathéter, (tube approprié pour une culture quantitative)
- masque, lunettes et surblouse si risque de projection

DEROULEMENT DU SOIN

- informer le patient
- installer le patient à plat ou en Trendelenbourg si le patient le tolère
- le cathéter doit être clampé et fermé par des bouchons.
- mettre le masque
- lavage des mains
- enlever le pansement et se désinfecter les mains
- ouvrir le set à pansement
- mettre les gants
- désinfecter le point avec un tampon stérile imbibé de désinfectant alcoolique
- couper les fils
- demander au patient d'inspirer et de bloquer sa respiration en fin d'inspiration (manoeuvre de Valsava) sauf si le cathéter est en fémoral.
- d'un geste rapide retirer le cathéter puis le patient peut reprendre sa respiration.
- appuyer immédiatement sur le point de ponction à l'aide d'un tampon stérile et maintenir la pression pour éviter le saignement
- poser le cathéter enlevé sur le plateau stérile

- désinfecter le lieu de ponction
- faire un pansement occlusif et étanche avec une compression de 3 mn
- faire un pansement compressif si le cathéter était fémoral et demander au patient de ne pas plier la jambe ni de se lever avant 1 heure après l'ablation du cathéter fémoral.
- contrôler l'intégrité du cathéter enlevé
- ouvrir le tube de culture
- couper le bout distal (2 à 3 cm) avec les ciseaux stériles du set à pansement
- enlever les gants

surveiller le pansement de manière régulière après l'ablation du cathéter pendant 1 heure surtout s'il était implanté en fémoral.

Avertir le médecin si le cathéter n'est pas entier lors du contrôle de son intégrité

Ablation de cathéter de dialyse dans les unités de soins :

et OAL

Les cathéters de dialyse peuvent être enlevés par les infirmières du 6 CL qui ont reçu l'information, et en tenant compte que les principes de sécurité cités ci-dessus seront respectés.

Pour toutes les autres unités, les cathéters provisoires de dialyse doivent être enlevés uniquement au 8 AL , par les infirmières d'hémodialyse.

DOCTEUR P.Y MARTIN

Mme M.G DROULEZ