

TRAITEMENT LOCAL DES INFECTIONS DE CATHETERS DE DIALYSE

Pour les cathéters de DP le plus souvent, mais ce protocole peut également être utilisé pour un cathéter d'hémodialyse.

SUR OM UNIQUEMENT.

Faire un frottis avant de commencer le traitement.

Faire une photo au début du traitement, puis 1 fois par semaine.

Emprunter l'appareil photo qui se trouve au 8AL ou téléphoner au service « photo » de l'hôpital. Un photographe vendra lui-même faire le cliché.

Des ampoules de 10 ml de NaCl à 3% sont disponibles à la pharmacie de l'hôpital (article 8194)

En cas de besoin, le NaCl à 3% peut être préparé de la façon suivante :

- mettre 15ml d'une ampoule de 20ml de NaCl à 20% dans un flex de 100ml de NaCl à 0,9%.

Procédure du soin :

- appliquer sur l'orifice infecté des compresses stériles bien imbibées de NaCl à 3%
- laisser en contact 10 minutes
- répéter l'application 3 fois en séchant avec des compresses stériles entre deux
- après la dernière application, bien sécher
- mettre du miel
- pansement sec
- **ne pas utiliser d'autre désinfectant**

Cette procédure sera répétée lors de chaque séance de dialyse, soit 3x par semaine.

Réévaluer après 2 semaines avec le médecin qui a prescrit le traitement.

Dr Catherine STOERMANN CHOPARD