

CLEXANE^R

Héparine à bas poids moléculaire, utilisable en hémodialyse en remplacement de la Fraxiparine chez les patients stables hémodialysés au 6^e et à l'Hoger sur prescription médicale. Les patients du 8^e pourront être traités sous Clexane (enoxaparine). L'indication par rapport à la Liquémine sera évaluée au cas par cas.

Administration et dosage : Prescription à effectuer dès le 20 septembre 2005

Au début de la séance, pratiquer une injection intra-vasculaire dans la ligne artérielle d'une dose unique d'environ 1mg/kg.

A titre indicatif :


< 50 kg	→	40mg (seringue 0,4ml)
51 à 70 kg	→	60mg (seringue 0,6ml)
71 à 90 kg	→	80mg (seringue 0,8ml)
> 90 kg	→	100mg (seringue 1,0ml)

- La dose initiale est suffisante pour 4 heures de dialyse.
- Une dose supplémentaire inférieure de moitié peut être administrée lors d'une dialyse plus longue.
- Chez les sujets à risque hémorragique, la dose initiale peut être diminuée de moitié.
- La posologie doit être individualisée ultérieurement, selon l'état du filtre.
- Pas d'adaptation chez les patients sous anticoagulants oraux.

En cas de problème :

- Contrôler l'activité de l'anti-facteur Xa
- Les doses devront être ajustées si l'activité anti Xa est inférieure à 0,4 UI/ml ou supérieure à 1,2 UI/ml.
- Labo d'Hémostase (Diogène)
Hémogard bleu 2,7ml (valeur thérapeutique KIUI 0,5-1)


Prof. P.-X. Martin
Médecin Chef


Dr. P. Saudan
Médecin adjoint


Mme M.-G. Droulez
IRUS