

EPO IV

- EPO se fait sur ordre médical.
 - Le produit est le même que pour la voie s/cut.
 - Le produit se conserve au frigo, le sortir 20 minutes maximum avant l'injection.
- L'injection doit s'effectuer dans la dernière demi-heure de la séance et pas lors de la restitution.
- Désinfecter le site d'injection bleu de la voie veineuse situé avant le piège à bulles.
- Injecter la dose prescrite dans le flux (ne pas diminuer la pompe à sang).

ATTENTION : l'injection dans le piège à bulles est interdite car :

- 1. Le plastique de la tubulure et du piège à bulles capte une partie des molécules d'EPO. Si on utilise par erreur ce site, bien rincer le site d'injection avec du NaCl.**
- 2. La fibrine présente dans le piège à bulles capte également une partie des molécules d'EPO.**

NB : En cas d'oubli, l'injection peut s'effectuer dans l'aiguille artérielle ou veineuse ou dans une des branches du cathéter après la restitution et rincer avec 10ml de NaCl.

Prof. Pierre-Yves Martin
Médecin chef

Marie-Geneviève Droulez
NRS

Réf. : Administration intraveineuse d'érythropoïétine chez les patients hémodialysés. J.Y. De Vos, L. Upsing . EDTNA/ERCA Journal XXIX3-2003 p.161-164