

**ADMINISTRATION D'INTERFERON ALPHA 2a (ROFERON A)**

- Indication** : Traitement de l'hépatite C chronique
- Posologie** : 3 Mio U 3 x/semaine, pendant un mois, puis, si bonne tolérance clinique et hématologique, ad Interféron alpha pégylé (PEGASYS) selon OM
- Administration** : Sous-cutanée, seringue prête à l'emploi à 3 Mio U / 0,5ml administration à faire après la dialyse
- Conservation** : doit être conservé sous emballage fermé, au frigo (entre 2 et 8°), à l'abri de la lumière
- Contrôles** : FSC  
Transaminases + TSH } avant le début du traitement
- FSC } 1 x / semaine  
Glycémie + calcémie
- Transaminases } après 1, 3 et 6 mois  
TSH
- Effets secondaires** :
- **Syndrome pseudo grippal**
  - **Hématotoxicité** avec thrombopénie, leucopénie, anémie dysthyroïdie
  - Tractus gastro-intestinal : perte d'appétit, nausées, vomissements, perte de poids, diarrhées, douleurs abdominales
  - Modification de la fonction hépatique : élévation des transaminases, phosphatase alcaline, LDH, bilirubine.
  - Système nerveux central : vertiges, obnubilation, troubles de la vision, dépression, somnolence, irritabilité
  - Système nerveux périphérique : paresthésies, perte de sensibilité, neuropathie, tremblements
  - Peau, muqueuses : poussée d'herpès labial, prurit, chute des cheveux, sécheresse de la peau
  - Autres : hypocalcémie, hyperglycémie
- Prévention du syndrome pseudo grippal** Administration d'1g de Dafalgan per os à donner 1 heure avant l'administration sous cutanée de l'Interféron<sup>α</sup>