

VACCINATIONS CHEZ L'ADULTE DIALYSE

1. INFLUENZA A et B (grippe)

Fluarix
Inflexal
Influvax
Mutagrip

Tous les ans, entre octobre et mi-novembre, chez tous les patients. (sauf refus du patient ou contre-indication médicale) :

0,5ml SC (une seule fois)

2. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Pneumovax 23

Tous les patients, en particulier ceux qui ont eu une splenectomie

0,5ml SC

Contrôle des anticorps à 3 ans et revaccination si nécessaire

3. HEPATITE B

Faire un dosage d'anticorps d'abord puis vaccination si taux inférieur à 20 mU/ml

Gen-H-Vax
Engerix
Heprecomb

Tous les patients, 4 injections :

40µg/ml à 0,1,2 et 6 mois

Contrôle des anticorps 1 mois après la 4^{ème} injection.

Puis contrôle des anticorps 1x/an

Si taux inférieur à 20 mU/ml : dose de rappel

4. VARICELLA ZOSTER

Varilrix

Faire un dosage d'anticorps d'abord puis vaccination Selon OM uniquement,
(mais tous les patients sur liste de greffe doivent être vaccinés)

2x 0,5ml SC à 6 semaines d'intervalle

Contrôle des anticorps 1x/an

Si nécessaire revaccination

5. HEPATITE A

Epaxal

Havrix

Vaqta


Selon OM uniquement , 2x1ml SC à 6 mois d'intervalle si :
voyage en zone endémique
si maladie hépatique chronique(alcoolisme,HCV et HBS)
si hémophile
si toxicomane

6.TETANOS ET DIPHTERIE

Anatoxal DiTe

3x0,5ml SC (effectuées dans l'enfance)

Un rappel d'office à tous les patients si pas de rappel dans les 10 ans, puis selon la nécessité.


Dr. C. Stoermann Chopard
Septembre 2001

PS : Pour les patients en période infectieuse, voir le médecin pour reporter les vaccinations.