

## Pansement Orifice cathéter de DP

### 1. A la maison :

Le patient le fait chaque jour ou tous les 2 jours. On enseigne au patient que le pansement doit être fait 3 x par semaine au minimum.

Le pansement se fait sans gants, sans masque et sans pince.

Si le patient se douche, il peut le faire avec le pansement qui se décollera en même temps, ou il peut enlever le pansement avant.

Utiliser le savon bétadiné de temps en temps, mais le patient peut prendre son savon de douche habituel.

Pour le pansement :

- Rincer et sécher avec une compresse.
- Se désinfecter les mains au Stérilium.
- Prendre les 3 tampons stériles imbibés de Bétadine verte un par un, avec les doigts et désinfecter autour du cathéter, toujours dans le même sens, en soulevant le cathéter vers le haut.
- Imbiber les bâtonnets montés stériles et faire de même.
- Laisser sécher la Bétadine.
- Pansement sec ou compresse fendue selon habitude du patient
- Pansement « Mépore » ou « Hansapore »

### 2. A l'hôpital par l'infirmière :

Masque (pas obligatoire)

Se désinfecter les mains au Stérilium.

Gants non stériles (pas obligatoires), enlever le pansement sale.

Vérifier la propreté et l'aspect de l'orifice.

Prélèvement bactériologique si c'est douteux. (écoulement)

Prendre les 3 tampons stériles imbibés de Bétadine verte un par un, avec les doigts et désinfecter autour du cathéter en soulevant le cathéter vers le haut.

Imbiber les bâtonnets stériles montés et faire de même.

Laisser sécher la Bétadine.


Enlever les gants

Se désinfecter les mains au Stérilium.

Pansement sec ou compresse fendue selon habitude du patient

Pansement « Mépore » ou « Hansapore » en faisant une boucle pour maintenir soûplement le cathéter.

Attention pas de traction sur le cathéter.



B.G-J

#### Un orifice:

- Propre
- Sec
- Pas d'érythème
- Pas de manchon
- Pas de croûte